



El manejo de terneros al nacer favorece a las crías para alcanzar el máximo potencial genético. Los protocolos de gestión de terneros de ABS Beef InFocus* son los siguientes:

Inmediatamente después del nacimiento:

- Retire el ternero lo más rápido posible del corral de maternidad para prevenir enfermedades y lesiones.
- Sumerja el ombligo del ternero en tintura de yodo al 7% o una mezcla 1: 1 de clorhexidina y alcohol al 70% durante los primeros 30 minutos posteriores al nacimiento.
- Etiquete al ternero según las pautas de Beef InFocus.
- Con el calostro de alta calidad se debe alimentar en las siguientes 2 horas posteriores al nacimiento de acuerdo con el siguiente protocolo.
- Registre la fecha de nacimiento, número de la madre, dificultad de parto y otra información relevante para el software de registros del predio.
- Asegúrese que el pelaje del ternero esté seco y esponjado antes de la exposición a temperaturas inferiores a 15.5 °C (60 °F).

Recolección y entrega de calostro:

- El calostro debe recogerse durante las 4 horas posteriores al parto.
- Las vacas, el equipo de ordeño, los contenedores de almacenamiento y recolección de calostro deben estar limpios. Evite el calostro de baja calidad y el calostro de animales conocidos positivos para Paratuberculosis.
- Dentro de las 2 horas posteriores al nacimiento, Deben ser suministrados 3.8 litros de calostro de alta calidad (> 22 Brix). Esto es el equivalente al 10% del peso corporal de un ternero de 40 kilos; por lo tanto, un ternero más pequeño puede recibir menos y viceversa.
- El calostro debe ser suministrado dentro de los primeros 30 minutos posteriores a la recolección, o enfriarse a 15.5 °C (60°F) para luego refrigerarse o congelarse.
- El calostro refrigerado debe ser utilizado dentro de las 48 horas posteriores a la recolección o desecharse. Al recalentar el calostro se debe calentar a 39 °C (102°F).
- Se debe volver a alimentar con 1.9 litros adicionales de calostro de alta calidad después de 12 horas de la primera alimentación.
- En ausencia de calostro fresco de alta calidad: alimente con un sustituto de calostro que exceda los 150 gramos de IgG a los terneros recién nacidos dentro de las 2 horas posteriores al nacimiento, con una alimentación adicional superior a 50 g de IgG 12 horas después de la primera.

Requisitos medioambientales:

- Limpie la cama en un área seca y bien aireada. Se recomiendan tener una cama de 15 a 25 centímetros.
- La ventilación debe ser adecuada para las condiciones ambientales.

- Los terneros deben protegerse de las inclemencias del tiempo, incluya sombra en instalaciones expuestas al sol.
- El establo y los corrales individuales deben desinfectarse y limpiar los espacios entre terneros.

Pautas adicionales:

- Un protocolo apropiado de vacunación para el rebaño de vacas ayudará a producir calostro de alta calidad para los terneros.
 - Los terneros deben comenzar un protocolo de vacunación de inmediato, basado en las recomendaciones de su veterinario asesor.
 - El calostro debe revisarse periódicamente durante el momento de la alimentación para detectar el encuentro de bacterias y garantizar un manejo adecuado. El calostro adecuadamente pasteurizado proporciona una prevención óptima de la enfermedad.
 - Se debe ofrecer agua limpia, paja y concentrado a los terneros a partir del día 1 de vida, según lo recomendado por el asesor del predio.
 - Los terneros InFocus NO necesitan ser descornados, ya que tienen el gen mocho. Se a corroborado con encuestas a los clientes.
- * Varias prácticas de manejo recomendadas son compatibles en alineación con los Estándares de Oro de la Asociación de Terneros y Lecherías.